

ที่ตรวจครรภ์ 2 ขีดแบบจ่อม ที่ตรวจครรภ์ขึ้น 2 ขีด อาจต้องใหม่

คุณแม่ตั้งครรภ์

บทความ

เม.ย. 2, 2024

เนหะ

หากผลตรวจจากที่ตรวจครรภ์ขึ้น 2 ขีด อาจไม่ได้หมายความว่าตั้งครรภ์เสมอไป เพราะมีปัจจัยเกี่ยวข้องกับฮอร์โมน hCG ซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากการปฏิสนธิแล้ว 6 วัน และอาจตรวจครรภ์หลังจากประจำเดือนขาดมาแล้ว 10-14 วัน ก็สามารถให้ผลที่แม่นยำมากขึ้น และเพื่อความแน่ใจว่า มีการตั้งครรภ์แน่นอน ควรเข้าพบแพทย์เฉพาะทางเพื่อทำการตั้งครรภ์ซึ่งมีความถูกต้องสูงที่สุด

สรุป

- การตรวจครรภ์โดยใช้ที่ตรวจครรภ์ เป็นที่นิยมอย่างมากเนื่องจากสามารถตรวจได้ด้วยตัวเอง และทำได้ง่าย มีความแม่นยำสูง โดยที่ตรวจครรภ์จะสามารถแบ่งออกเป็น 3 ชนิดหลัก ๆ เช่น แบบแบบจ่อม ที่ตรวจแบบนี้จะมีราคาถูก วิธีการคือปั๊สสาวะลงในถ้วยตัวงแล้วนำแผ่นทดสอบจุ่มลงในถ้วยตัวง ทิ้งไว้ประมาณ 3 วินาที และนำออกมายกถ้วยตัวงและทิ้งไว้ประมาณ 5 นาที และอ่านผลตรวจ ต่อมาก็คือแบบปั๊สสาวะผ่าน ซึ่งจะใช้การปั๊สสาวะผ่านบริเวณแห่งตรวจประมาณ 30 วินาที และทิ้งไว้ 3-5 นาที แล้วจึงอ่านผลตรวจ ถูกต้องคือแบบหยด เป็นการหยดน้ำปั๊สสาวะลงในตลับตรวจครรภ์ 3-4 หยด และทิ้งไว้ประมาณ 5 นาที และจึงอ่านผลการตรวจต่อไป
- ผลการตรวจครรภ์ที่ปรากฏ ไม่สามารถยืนยันว่าตั้งครรภ์หรือไม่ตั้งครรภ์ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งอาจมีการคลาดเคลื่อนได้ เช่น หากกำลังมีการตั้งครรภ์เกิดขึ้น แต่ผลตรวจขึ้น 1 ขีด อาจเกิดจากปั๊สสาวะที่ตรวจมีความเจือจาง หรือตรวจในช่วงเวลาที่เร็วเกินไป หรือหากค่าผลตรวจขึ้น 2 ขีด แต่ความเป็นจริงคือไม่มีการตั้งครรภ์ ซึ่งอาจเกิดได้จากการตรวจในช่วงเวลาเร็วเกินไปด้วยเช่นกัน และถูกต้องอาจเกิดจากชุดตรวจครรภ์ชำรุดหรือเสื่อมคุณภาพ เนื่องมาจากชุดตรวจครรภ์หมดอายุการใช้งาน หรือมีการจัดเก็บที่ไม่ดีพอก็สามารถทำให้การตรวจคลาดเคลื่อนด้วยเช่นกัน

เลือกอ่านตามหัวข้อ

- ออร์โมน hCG ในปัสสาวะ สำคัญกับการตรวจครรภ์มากแค่ไหน
- ที่ตรวจครรภ์ขึ้น 2 ชีด แต่ไม่ท้อง เป็นไปได้ไหม
- ตรวจครรภ์ 2 ชีด จำนวนมาก ๆ เกิดจากอะไร
- ตรวจครรภ์ 1 ชีด บ่งบอกอะไรได้บ้าง
- ตรวจครรภ์ช้ารอบสอง จะได้ผลแม่นยำจริงไหม
- ตรวจครรภ์กับแพทย์วิธีไหนบ้าง ที่ให้ผลชัวร์

ออร์โมน hCG ในปัสสาวะ สำคัญกับการตรวจครรภ์มากแค่ไหน

ออร์โมน hCG เป็นออร์โมนที่ผลิตจากถุงการตั้งครรภ์เท่านั้น ซึ่งหลักการทำงานของที่ตรวจครรภ์คือการหาออร์โมน hCG ในปัสสาวะเป็นหลัก ดังนั้นผลจากการตรวจครรภ์จะมีความแม่นยำสูงถึง 99 เปอร์เซ็นต์เลยที่เดียว โดยที่ตรวจครรภ์ที่ใช้ตรวจโดยทั่วไปจะมีความแตกต่างกันในเรื่องรูปแบบ การใช้งาน เช่น แบบฉุ่ม แบบหยด และแบบปัสสาวะผ่าน เป็นต้น โดยแบบปัสสาวะผ่านจะใช้งานง่ายที่สุด และได้รับความนิยมมากที่สุดอีกด้วย

ที่ตรวจครรภ์ขึ้น 2 ชีด แต่ไม่ท้อง เป็นไปได้ไหม

ผลที่ตรวจครรภ์ขึ้น 2 ชีด แต่ไม่ท้องสามารถเกิดขึ้นได้ อันเนื่องมาจากหลายสาเหตุเช่น ที่ตรวจครรภ์เสื่อมประสิทธิภาพ การตรวจในระหว่างที่ทานยาบางชนิดที่อาจมีผลต่อระดับออร์โมนในร่างกาย มีอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบ มีเลือด หรือมีไข้ข้างในปัสสาวะ และอาจจะเกิดได้ในผู้ที่มีออร์โมนผิดปกติ เช่น ผู้หญิงที่นำหนักตัวมาก หรือผู้ที่เป็นโรคไตรอยด์ เป็นต้น



ตรวจครรภ์ 2 ขีดじゃมาก ๆ เกิดจากอะไร

ที่ตรวจครรภ์ขึ้น 2 ขีดแต่じゃมาก ๆ และแสดงว่าผลตรวจตั้งครรภ์เป็นบวก มีโอกาสตั้งครรภ์สูงแต่อาจ เพราะเป็นการตั้งครรภ์ในช่วงแรก ๆ ที่ฮอร์โมน hCG ยังสูงไม่มากนัก จึงทำให้ที่ตรวจครรภ์ขึ้น 2 ขีดじゃมาก ๆ ดังนั้นเจ็บปวดเรื้อรังยังห่างประมาณ 2-3 วันแล้วจึงตรวจซ้ำเพื่อเป็นการยืนยันการตั้งครรภ์ และควรเข้าพบแพทย์เพื่อตรวจดูอาการตั้งครรภ์และตรวจดูสุขภาพของครรภ์ต่อไป

ตรวจครรภ์ 1 ขีด บ่งบอกอะไรได้บ้าง

ที่ตรวจครรภ์ขึ้น 1 ขีด และแสดงว่าผลตรวจตั้งครรภ์เป็นลบ ไม่มีการตั้งครรภ์หรืออาจมีการตั้งครรภ์แต่ที่ตรวจครรภ์ตรวจไม่พบก็สามารถถูกเกิดขึ้นได้ ดังนั้นควรเว้นระยะห่างประมาณ 2-3 วัน แล้วจึงตรวจซ้ำ หรือหากประจำเดือนไม่มาตามกำหนดก็ควรมีการตรวจซ้ำด้วยเช่นกัน เพื่อเป็นการยืนยันการไม่ตั้งครรภ์

ตรวจครรภ์ช้ำรอบสอง จะได้ผลแม่นยำจริง ไหม

เพื่อเป็นการยืนยันผลการตรวจน้ำเหลืองให้แน่ใจ ควรมีการตรวจช้ำรอบสอง โดยมีการเว้นระยะเวลาประมาณ 2-3 วัน เพื่อให้ออร์โมน hCG เกิดขึ้นมากพอที่จะสามารถตรวจช้ำรอบสองได้

ตรวจครรภ์กับแพทย์วิธีไหนบ้าง ที่ให้ผลชัวร์

การตรวจครรภ์กับแพทย์จะมีทั้งหมด 3 วิธี คือ

1. การตรวจการตั้งครรภ์โดยห้องปฏิบัติการ

เป็นการตรวจครรภ์แบบจุ่มหรือแบบหยด โดยการตรวจครรภ์ลักษณะนี้จะเหมือนกับการตรวจครรภ์ด้วยตนเอง วิธีการตรวจคือเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะให้กระป๋องเพื่อให้เก็บปัสสาวะไปให้ห้องแล็บ ซึ่งโดยทั่วไปจะสามารถตรวจได้แม่ระดับออร์โมนยังไม่สูงมากนัก

2. การเจาะเลือดตรวจการตั้งครรภ์

จะเป็นวิธีที่ให้ผลแม่นยำที่สุดและสามารถตรวจพบการตั้งครรภ์ได้ตั้งแต่ 14 วันหลังจากมีการปฏิสนธิได้อีกด้วย ในขณะที่การตรวจจากปัสสาวะอาจจะยังไม่ขึ้นผล แต่การตรวจเลือดจะสามารถพบรอยละลายในครรภ์แล้ว ยังเหมาะสมสำหรับผู้ที่ต้องการตรวจให้แน่ใจว่าตั้งครรภ์หรือไม่อย่างรวดเร็ว เช่น ผู้ที่มีประวัติแท้งบุตร และผู้ที่มีภาวะมีบุตรยาก เพื่อใช้ในการวางแผนและดูแลการให้ออร์โมนเสริมต่าง ๆ เพื่อป้องกันการแท้งบุตร

3. การตรวจการตั้งครรภ์ด้วยการอัลตราซาวด์

เป็นวิธีการตรวจโดยการส่งคลื่นเสียงความถี่สูงไปยังอวัยวะภายในต่าง ๆ ในช่องท้อง ถ้าหากมีการตั้งครรภ์จะพบตัวอ่อนของทารกในครรภ์ และนอกจากจะใช้ในการตรวจการตั้งครรภ์แล้วยังสามารถบอกตำแหน่งการตั้งครรภ์ เพื่อใช้ในการวางแผนดูแลการในครรภ์ได้อีกด้วย



เมื่อคุณผู้หญิงพบว่ามีโอกาสตั้งครรภ์ เช่น ประจำเดือนขาด คลื่นไส้อเจียน เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียง่าย ห้องอีดห้องเพื่อ อาการแน่นหน้าท้อง โดยส่วนใหญ่จะใช้วิธีการตรวจครรภ์ด้วยตนเอง ซึ่งสามารถทำได้ง่ายๆ โดยการซื้อชุดตรวจการตั้งครรภ์ที่จำหน่ายอยู่ในร้านค้าทั่วไป ซึ่งวิธีนี้จะเป็นวิธีทดสอบ荷อร์โมน hCG ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่บ่งบอกถึงการตั้งครรภ์ โดยจะหลังจากมาจากการหลังจากปฏิสนธิไปแล้ว 6 วัน หลังการมีเพศสัมพันธ์ หากต้องการให้แน่ใจว่ามีการตั้งครรภ์จริง ควรเข้าตรวจการตั้งครรภ์กับแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเพื่อยืนยันการตั้งครรภ์ต่อไป

บทความแนะนำสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์

- พัฒนาการทางใบหน้า 1-40 สัปดาห์ ที่แม่มือใหม่ห้ามพลาด
- อาการแพ้ห้องของคุณแม่ แพ้ห้องพะอีดูพะอม แก้ยังไง พร้อมวิธีรับมือ
- อาการคนท้องระยะแรก สัญญาณการตั้งครรภ์เป็นแบบนี้
- เมนูคนท้อง อาหารคนท้องบำรุงคุณแม่ห้อง ดีต่อรกในครรภ์
- คนท้องห้ามกินอะไร อาหารที่ส่งผลเสียต่อคุณแม่ตั้งครรภ์
- อาหารคนท้องไตรมาสแรก โภชนาการที่สำคัญสำหรับคุณแม่และทารกในครรภ์
- วิธีนับอายุครรภ์ คำนวนอายุครรภ์ด้วยตัวเอง ก่อนคลอด
- สัญญาณอาการไกลคลอด เจ็บห้องคลอด อาการก่อนคลอดของคุณแม่
- บล็อกหลังผ่าคลอด คืออะไร เรื่องที่คุณแม่ต้องรู้ เกี่ยวกับการบล็อกหลัง
- ผ่าคลอด กีสัปดาห์ ห้องกีสัปดาห์คลอด ถึงปลดล็อกภัยสำหรับลูกน้อย
- ของใช้เตรียมคลอด ที่คุณแม่มีไว้ใหม่ควรเตรียมของไปคลอด
- คุณแม่ผ่าคลอดได้กี่ครั้ง ผ่าคลอดมีลูกได้กี่คน ผ่าคลอดบ่อยอันตรายไหม
- ออกกำลังกายหลังคลอด สำหรับคุณแม่หลังผ่าคลอด

- ຖក្យ់គម្រោង ឬតាមរបៀបដែលបានបង្ហាញ

ចំណាំ:

1. ផលិតផលទីត្រូវគម្រោង... និងរបៀបដែលបានបង្ហាញ, សាខាបាលពេក
2. តម្លៃទីត្រូវគម្រោង ឬតាមរបៀបដែលបានបង្ហាញ, ឬតម្លៃទីត្រូវគម្រោង ឬតាមរបៀបដែលបានបង្ហាញ
3. 4 វិធីទីត្រូវគម្រោង ឬតាមរបៀបដែលបានបង្ហាញ, សាខាបាលពេក
4. តម្លៃទីត្រូវគម្រោង ឬតាមរបៀបដែលបានបង្ហាញ, សាខាបាលពេក
5. ទីត្រូវគម្រោង ឬតាមរបៀបដែលបានបង្ហាញ (លម្អិត Update ឆ្នាំ 2567), សាខាបាលពេក

ចំណាំ នៅ ថ្ងៃទី 26 មករាំ 2567



គម្រោង
និងរបៀបដែលបានបង្ហាញ



នាមដ្ឋាន

ดูแลลูกตามช่วงวัย

ภูมิแพ้ในเด็ก



เอโลฟ้าแอล์ค สพิงโกไม้อีลิน

พัฒนาการสมองลูกน้อย

การขับถ่ายลูกน้อย

คุณแม่ให้นมบุตร



เครื่องมือตัวช่วยคุณแม่



อาหารเด็ก



S-Mom Club



ข้อมูลผลิตภัณฑ์



ໂປຣໂມໝ່ານ